

Hamamelis composé Gránulos

MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado este medicamento para obtener los mejores resultados.

- *Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.*
- *Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.*
- *Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar a un médico.*

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es este medicamento y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar este medicamento
- 3- ¿Cómo tomar este medicamento?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de este medicamento

Las sustancias activas son:

Hamamelis virginiana	3CH
Anemone pulsatilla	3CH
Echinacea angustifolia	3CH
Fluoricum acidum	3CH
Viburnum prunifolium	3CH
Tussilago farfara	3CH
Corylus avellana	3DH
Aesculus hippocastanum	3DH
aa c.s.p 0,04 ml.	

Los demás componentes son: sacarosa (85%) y lactosa (15%) c.s.p 1 tubo de 4 g de gránulos.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON SIH, s.a.
Av. Valdelaparra, nº 27
28108 Alcobendas – Madrid

Fabricante :

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy- Francia

1. ¿QUÉ ES ESTE MEDICAMENTO Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Hamamelis composé es un medicamento homeopático tradicionalmente utilizado en el tratamiento de los trastornos de la circulación venosa: piernas cansadas, varices.
Este medicamento se presenta con un tubo de 80 gránulos.

2. ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

Este producto puede presentar cierta toxicidad en caso de no respetar la dosis prescrita.

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

A la dosis recomendada, este medicamento no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica”

3. ¿CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Para extraer los gránulos del tubo, retirar la lengüeta de la etiqueta, volcar el tubo y girar el cuentagránulos hasta obtener el número de gránulos deseado.

Volcar los gránulos directamente desde el tapón a la boca y dejar que se disuelvan debajo de la lengua.

Salvo que se le haya indicado otra posología, disolver 5 gránulos 3 veces al día.

Vía oral. Absorción sublingual.

“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas”

“Recuerde tomar su medicamento”

Si estima que la acción de este medicamento es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar con su médico.

Si usted ha tomado este medicamento más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar este medicamento no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, puede provocar efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaram.es>.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE ESTE MEDICAMENTO

No conservar a temperatura superior de 25°C.

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

“Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y

los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  *de su farmacia habitual*

.Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.”

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.



02/2016